

Esame scritto di Geometria A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

A.A. 2015/2016

Appello di giugno 2016

Esercizio 1

Nello spazio vettoriale \mathbb{R}^4 , si considerino i sottospazi affini

$$U_a = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} ax + y + (2 - a)z + aw = 2 \\ x - z = 0 \end{cases} \right\},$$
$$V_b = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} 2x + y + bz + w = -1 \\ (b + 3)x + 2y + z = 1 \end{cases} \right\},$$

con a e b parametri reali.

- (i) Determinare per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ la dimensione degli spazi affini U_a e V_b .
- (ii) Determinare, $\forall h \in \mathbb{R}$, equazioni parametriche dello spazio affine $U_h \cap V_h$.
- (iii) Determinare, $\forall h \in \mathbb{R}$, se U_h e V_h sono rispettivamente coincidenti, paralleli non coincidenti, incidenti o sghembi, e determinare la dimensione del più piccolo sottospazio affine di \mathbb{R}^4 contenente tanto U_h quanto V_h .

Esercizio 2

Calcolare lo spettro dell'operatore di \mathbb{C}^4 descritto dalla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinare se l'operatore è diagonalizzabile. In caso affermativo, esibire una base diagonalizzante, altrimenti determinare la forma canonica di Jordan dell'operatore.

Esercizio 3

Si consideri lo spazio euclideo reale \mathbb{E}^4 dotato di un riferimento cartesiano ortonormale di coordinate (x, y, z, w) . Si considerino il sottospazio r di equazioni

$$x - y = z - w = y + z - 1 = 0$$

e il punto A di coordinate $(2, 1, 1, 0)$.

- (i) Si ricavino delle equazioni parametriche per l'iperpiano H ortogonale a r e passante per il punto A . Sia B l'intersezione di H con r ;
- (ii) Individuare, su r , un punto C tale che il triangolo T di estremi A, B e C sia isoscele e la coordinata w di C sia negativa. Quanto valgono gli angoli interni di T ?
- (iii) Ricavare la proiezione ortogonale del punto $D(-1, 2, -4, 0)$ sul piano contenente il triangolo T .

Esercizio 4

Si consideri il piano euclideo \mathbb{E}^2 con coordinate ortogonali (x, y) e il piano proiettivo \mathbb{P}^2 reale con coordinate omogenee $[x_0, x_1, x_2]$. Si identifichi \mathbb{E}^2 con $\mathbb{P}^2 \setminus \{x_0 = 0\}$ con la scelta $x = x_1/x_0$ e $y = x_2/x_0$. Si considerino, in \mathbb{E}^2 , le curve

$$\mathcal{C} : f(x, y) = -2x^3 + 6x^2y - 9xy^2 + (a + 50)x + 5y^3 + (a - 50)y = 0,$$

$$\mathcal{D} : g(x, y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 - 50 = 0.$$

Si indichi con $\bar{\mathcal{C}}$ la chiusura proiettiva di \mathcal{C} .

- (i) Dimostrare che, per $a = 50$, $\bar{\mathcal{C}}$ è liscia e che il punto $(0, 0)$ è di flesso per \mathcal{C} . Qual è la tangente inflessionale?
- (ii) Sapendo che il risultante $\text{Res}_x(f, g)$ è $4a^2(11y^2 - 50)$, dimostrare che, per $a = 0$, $\bar{\mathcal{C}}$ è riducibile e ricavarne le componenti.
- (iii) Scrivere un'isometria che trasforma \mathcal{D} nella sua forma canonica euclidea.

Esame scritto di Geometria II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

A.A. 2014/2015

Appello di giugno 2016

Esercizio 5

Si consideri lo spazio euclideo reale \mathbb{E}^4 dotato di un riferimento cartesiano ortonormale di coordinate (x, y, z, w) . Si considerino il sottospazio r di equazioni

$$x - y = z - w = y + z - 1 = 0$$

e il punto A di coordinate $(2, 1, 1, 0)$.

- (i) Si ricavino delle equazioni parametriche per l'iperpiano H ortogonale a r e passante per il punto A . Sia B l'intersezione di H con r ;
- (ii) Individuare, su r , un punto C tale che il triangolo T di estremi A, B e C sia isoscele e la coordinata w di C sia negativa. Quanto valgono gli angoli interni di T ?
- (iii) Ricavare la proiezione ortogonale del punto $D(-1, 2, -4, 0)$ sul piano contenente il triangolo T .
- (iv) Sul piano euclideo $z = w = 0$ si consideri la conica

$$\mathcal{C} : f(x, y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 - 50 = 0$$

e si scriva un'isometria inversa che trasforma \mathcal{C} nella sua forma canonica euclidea.

Esercizio 6

Sia $I := [0, 1)$ e si consideri lo spazio topologico $X = (I, \tau)$ dove τ è la topologia generata dalla seguente collezione di sottoinsiemi di I :

$$\{(0, \delta) \mid \delta \in (0, 1]\}.$$

Si consideri il sottospazio $Y = (\{0\} \cup (1/2, 1), \tau_Y)$ con τ_Y topologia indotta da quella su X .

- (i) Dimostrare che X è connesso e T_0 .
- (ii) X è T_1 ? X è compatto? X è connesso per archi? X è uno spazio di Hausdorff?
- (iii) Calcolare la chiusura di $\{0\}$ e di $\{3/4\}$ in Y .
- (iv) Esibire, se possibile, un arco continuo in Y che collega 0 a $3/4$.

Soluzione dell'esercizio 1

(i) Nelle due equazioni che definiscono U_a osserviamo che il coefficiente della variabile y è diverso da zero nella prima e uguale a zero nella seconda. Se le due equazioni fossero linearmente dipendenti, quindi proporzionali, ne deriverebbe allora che la seconda è identicamente nulla, assurdo. Quindi le due equazioni che definiscono U_a sono linearmente indipendenti per ogni valore di a , che ha quindi dimensione $4 - 2 = 2$.

Analogo argomento applicato ai coefficienti della variabile w (o z) delle equazioni di V_b mostra che anche V_b è un piano. (Si poteva in ambo i casi argomentare anche in altre maniere, per esempio scrivendo la matrice completa del sistema e mostrando un minore 2×2 non nullo).

(ii) Lo spazio affine $U_h \cap V_h$ ha equazioni cartesiane

$$\begin{cases} hx + y + (2 - h)z + hw = 2 \\ x - z = 0 \\ 2x + y + hz + w = -1 \\ (h + 3)x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

Imposto la matrice completa del sistema e opero un'eliminazione che tiene conto della presenza dei parametri, e quindi scambio opportunamente righe in modo da ridurre i calcoli.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} h & 1 & 2-h & h & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & h & 1 & -1 \\ h+3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & h & 1 & -1 \\ h & 1 & 2-h & h & 2 \\ h+3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h+2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & h & 2 \\ 0 & 2 & h+4 & 0 & 1 \end{array} \right) &\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -h & h-1 & 3 \\ 0 & 0 & -h & -2 & 3 \end{array} \right) \Leftrightarrow \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & h & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -h & h-1 & 3 \end{array} \right) &\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & h & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & h+1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

ne segue che la matrice dei coefficienti ha rango 4, e quindi soluzione unica, per $h \notin \{0, -1\}$. Cominciamo allora studiando questi due casi particolari.

$h = 0$. In questo caso le equazioni relative alle ultime due righe della matrice ottenuta sono $w = 0$ e $2w = -3$ che non sono compatibili per cui il sistema non ha soluzioni. Quindi per $h = 0$ lo spazio affine $U_h \cap V_h$ è vuoto.

$h = -1$. In questo caso l'ultima riga si annulla, la matrice dei coefficienti e la matrice completa hanno ambedue rango 3 e quindi lo spazio affine $U_h \cap V_h$ ha dimensione $4 - 3 = 1$. Risolvendo il sistema otteniamo le equazioni parametriche della retta

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$h \notin \{0, -1\}$. In questo caso possiamo dividere la terza riga per h e la quarta per $h + 1$ ottenendo la matrice

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/h & -3/h \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

la cui soluzione unica è

$$\begin{pmatrix} -3/h \\ 2 + 6/h \\ -3/h \\ 0 \end{pmatrix}$$

(iii) $h \notin \{0, -1\}$. In questo caso, dal momento che si tratta di due piani in uno spazio di dimensione 4 che si intersecano in un punto, essi sono incidenti. Il più piccolo sottospazio affine che li contiene entrambi ha dimensione $2 + 2 - 0 = 4$ (e quindi è l'intero spazio \mathbb{R}^4).

$h = -1$. Anche in questo caso, dal momento che si tratta di due piani in uno spazio di dimensione 4 che si intersecano in una retta, essi sono incidenti. Il più piccolo sottospazio affine che li contiene entrambi ha dimensione $2 + 2 - 1 = 3$.

$h = 0$. In questo caso i due piani non si intersecano, quindi sono paralleli o sghembi. Se fossero paralleli avrebbero la medesima giacitura e quindi la matrice dei coefficienti avrebbe rango 2. Essa ha invece rango 3 e quindi sono sghembi e il più piccolo sottospazio affine che li contiene entrambi ha quindi dimensione $3 + 1 = 4$ (e quindi è l'intero spazio \mathbb{R}^4).

Soluzione dell'esercizio 2

Calcoliamo il polinomio caratteristico della matrice data

$$\begin{aligned} \det(A - tI_4) &= \det \begin{pmatrix} 4-t & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2-t & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 4-t & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} = \\ &= (4-t) \det \begin{pmatrix} 2-t & -2 & -2 \\ 1 & 4-t & 1 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 4-t & 1 \\ 1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} + \\ &\quad - 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2-t & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2-t & -2 \\ -1 & 1 & 4-t \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= (4-t)\{(2-t)[(4-t)(2-t)+1]+2(2-t+1)-2(-1+4-t)\}+[(4-t)(2-t)+1+2(t-2-1)-2(1-4+t)]+ \\ &\quad - 2[2-t+1+(t-2)(t-2-1)]+2[-1+4-t+(t-2)(1-4+t)] = \\ &= (4-t)\{(2-t)[t^2-6t+8+1]+2(3-t)-2(3-t)\}+[t^2-6t+8+1+2(t-3)-2(t-3)]+ \\ &\quad - 2[3-t+(t-2)(t-3)]+2[3-t+(t-2)(t-3)] = \\ &= (4-t)\{(2-t)[t^2-6t+9]\}+[t^2-6t+9] = (t^2-6t+9)[(4-t)(2-t)+1] = \\ &= (t^2-6t+9)^2 = (t-3)^4. \end{aligned}$$

Quindi lo spettro dell'operatore è composto dal singolo autovalore 3 con molteplicità algebrica 4.

Per calcolarne la molteplicità geometrica osserviamo che la matrice

$$A - 3I_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

ha rango 2: infatti la seconda colonna è uguale alla prima cambiata di segno, e la quarta colonna è uguale alla terza (il che implica che il rango è al massimo due) mentre la prima e la terza non sono proporzionali (e quindi è almeno due). Quindi la matrice non è diagonalizzabile, e la sua forma di Jordan ha due blocchi, entrambi relativi all'autovalore 3.

Ciò non basta per determinare la forma di Jordan: i due blocchi potrebbero avere entrambi ordine 2 o essere uno di ordine 1 e uno di ordine 3. Per risolvere il dubbio basta calcolare il

rango di $(A - 3I_4)^2$. Moltiplicando righe per colonne otteniamo che $(A - 3I_4)^2$ è la matrice nulla. Ne consegue che nessun blocco di Jordan della matrice ha ordine strettamente maggiore di due per cui la forma di Jordan della matrice è

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Soluzione dell'esercizio 3

Ricaviamo un sistema di equazioni parametriche per r :

$$r : \begin{cases} x - y = 0 \\ z - w = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = y \\ w = z \\ y = 1 - z \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - t \\ z = t \\ w = t. \end{cases}$$

La giacitura di r è generata dal vettore $d = (-1, -1, 1, 1)$ perciò l'iperpiano cercato ha equazione $-(x - 2) - (y - 1) + (z - 1) + (w) = 0$, cioè

$$H : -x - y + z + w + 2 = 0.$$

Dei generatori per il complemento ortogonale di $\langle d \rangle$ sono i vettori

$$(-1, 1, 0, 0)^T, (1, 0, 1, 0)^T \quad \text{e} \quad (1, 0, 0, 1)^T$$

quindi un sistema di equazioni parametriche per H è il seguente:

$$\begin{cases} x = 2 - \alpha + \beta + \gamma \\ y = 1 + \alpha \\ z = 1 + \beta \\ w = 0 + \gamma. \end{cases}$$

L'intersezione tra H ed r si può ottenere partendo dall'equazione di H e sostituendo l'espressione parametrica di r nell'equazione:

$$-(1 - t) - (1 - t) + t + t + 2 = 0 \iff 4t = 0.$$

L'intersezione sarà quindi il punto che corrisponde a $t = 0$, cioè

$$B = (1, 1, 0, 0).$$

La lunghezza del lato del triangolo di estremi A e B si ottiene ricavando il modulo di $v = A - B$:

$$\overline{AB} = d(A, B) = \|A - B\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Dobbiamo cercare un punto su r che disti $\sqrt{2}$ da B . Sia P_t il punto di r identificato da $P_t = B + td$. Siccome

$$d(P_t, B) = \|P_t - B\| = \|B + td - B\| = |t| \|d\| = |t|\sqrt{1 + 1 + 1 + 1} = 2|t|$$

C sarà uno dei punti ottenuti ponendo $|t| = \sqrt{2}/2$. Dovendo scegliere il punto con coordinata w negativa avremo

$$C = (1 + \sqrt{2}/2, 1 + \sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2).$$

In questo modo il triangolo ABC è isoscele e, per costruzione, rettangolo in B , quindi i suoi angoli varranno $\pi/4, \pi/4$ e $\pi/2$.

Sia π il piano contenente il triangolo T . Scegliamo un punto di π , ad esempio B e ricaviamo una base per la giacitura di π formata da vettori della forma $P - B$. Possiamo scegliere, ad esempio, i vettori $v_1 = A - B$ e $v_2 = d$. Poichè v_1 e v_2 sono ortogonali, la proiezione ortogonale u_{\parallel} del vettore $u = D - B$ sulla giacitura è dato da

$$\frac{\langle u, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 + \frac{\langle u, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2.$$

Abbiamo

$$\begin{aligned} u &= (-2, 1, -4, 0) \\ v_1 &= (1, 0, 1, 0) & \langle v_1, u \rangle &= -6 & \langle v_1, v_1 \rangle &= 2 \\ v_2 &= (-1, -1, 1, 1) & \langle v_2, u \rangle &= -3 & \langle v_2, v_2 \rangle &= 4 \end{aligned}$$

da cui

$$u_{\parallel} = -3v_1 - \frac{3}{4}v_2 = \frac{1}{4}(-9, 3, -15, -3).$$

Il punto cercato è quindi

$$P = B + u_{\parallel} = \frac{1}{4}(-5, 7, -15, -3).$$

Soluzione dell'esercizio 4

Per le equazioni di $\bar{\mathcal{C}}$ basta omogeneizzare usando le relazioni $x = x_1/x_0$ e $y = x_2/x_0$:

$$\bar{\mathcal{C}} : F(x_0, x_1, x_2) = -2x_1^3 + 6x_1^2x_2 - 9x_1x_2^2 + 5x_2^3 + (a + 50)x_0^2x_1 + (a - 50)x_0^2x_2 = 0.$$

Dimostrare che $\bar{\mathcal{C}}$ è riducibile per $a = 0$ è semplicissimo: sappiamo che \mathcal{C} è riducibile poichè il risultante $\text{Res}_x(f, g)$ è identicamente nullo per $a = 0$. Questo vuol dire che \mathcal{C} e \mathcal{D} hanno una componente in comune. Vediamo che tipo di curva algebrica è \mathcal{D} . Avendo grado 2 è una conica ed è non degenera infatti la matrice associata è

$$A = \left[\begin{array}{c|cc} -50 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{array} \right]$$

e ha determinante $-50 \cdot 6$. La matrice A_0 dei termini quadratici ha determinante 6 quindi \mathcal{D} è un'ellisse. Gli autovalori di A_0 si ricavano facilmente sapendo che la traccia è 7: questi sono $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$. Poichè il segno del determinante di A è negativo concludiamo che l'ellisse e a punti reali. Essendo non degenera è anche irriducibile. Quindi sappiamo che \mathcal{D} è una delle componenti di \mathcal{C} per $a = 0$. Per trovare l'altra componente cerchiamo un polinomio di primo grado $h(x, y) = ax + by + c$ tale che $f = gh$. Confrontando il coefficiente di x^3 in f e quello di x^2 in g si vede subito che $a = -1$. Similmente si ricavano $b = 1$ e $c = 0$. Un semplice conto verifica che $f = gh$ con $h = x - y$. Abbiamo quindi le due componenti di \mathcal{C} che sono la conica \mathcal{D} e la retta $x - y = 0$. Le componenti di $\bar{\mathcal{C}}$ sono quindi $\bar{\mathcal{D}}$ e la retta $x_1 - x_2 = 0$.

Poniamo $a = 50$. Per dimostrare che la curva $\bar{\mathcal{C}}$ è liscia consideriamo le sue derivate parziali e annulliamole simultaneamente. In particolare, la derivata rispetto x_0 è $200x_0x_1$ da cui ricaviamo che i punti singolari, se esistono, stanno su $x_0 = 0$ o su $x_1 = 0$. Le altre due derivate parziali sono

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = -6x_1^2 + 12x_1x_2 - 9x_2^2 + 100x_0^2$$

e

$$\frac{\partial F}{\partial x_2} = 6x_1^2 - 18x_1x_2 + 15x_2^2.$$

Se poniamo $x_1 = 0$ abbiamo $x_2 = 0$ dalla seconda equazione. Ma a questo punto la prima equazione può essere soddisfatta solo se $x_0 = 0$. Se invece poniamo $x_0 = 0$ abbiamo il sistema

$$\begin{cases} -6x_1^2 + 12x_1x_2 - 9x_2^2 = 0 \\ 6x_1^2 - 18x_1x_2 + 15x_2^2 \end{cases} \quad \begin{cases} -6x_2(x_1 + x_2) = 0 \\ 6x_1^2 - 18x_1x_2 + 15x_2^2 \end{cases}$$

quindi abbiamo $x_2 = 0$ o $x_1 = x_2$. Se $x_2 = 0$ ricadiamo nell'assurdo quindi l'unica possibilità è che valga $x_1 = x_2$. In tal caso dall'ultima equazione otteniamo $x_1 = 0$ che porta comunque ad un assurdo. Abbiamo dimostrato che l'unica soluzione del sistema ottenuto ponendo il gradiente uguale a 0 è $[0, 0, 0]$ che non corrisponde a nessun punto di \mathbb{P}^2 . Questo dimostra quindi che $\bar{\mathcal{C}}$ è una cubica liscia (e lo stesso vale per \mathcal{C}).

Consideriamo una retta in forma parametrica passante per il punto $P = (0, 0)$. Ogni retta r di questo tipo si scrive come $x = bt, y = ct$. Se sostituiamo queste equazioni nell'equazione della cubica abbiamo

$$(-2b^3 + 6b^2c - 9bc^2 + 5c^3)t^3 + 100bt = 0.$$

Questo ci dice che $m_P(\mathcal{C}) = 1$ (cosa nota poichè la cubica è liscia) e

$$I(\mathcal{C}, r, P) = \begin{cases} 1 & \text{se } b \neq 0 \\ 3 & \text{se } b = 0. \end{cases}$$

Questo dimostra che la tangente in P a \mathcal{C} è $x = 0$ ed è tangente inflessionale (e che P è flesso) poichè la molteplicità di intersezione è 3.

Sappiamo già che gli autovalori di A_0 sono 1 e 6. Due autovettori corrispondenti sono $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (1, -2)$. Un'isometria che trasforma la conica nella sua forma canonica euclidea è quindi

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x + y) \\ y_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(x - 2y) \end{cases}$$

poichè nell'equazione non sono presenti i termini lineari e quindi non è necessario operare una traslazione.

Soluzione dell'esercizio 5

Si veda la soluzione dell'esercizio 3 e del punto (iii) dell'esercizio 4.

Soluzione dell'esercizio 6

La topologia τ è composta, oltre che da X e dall'insieme vuoto, di tutti e soli gli insiemi del tipo $(0, \delta)$ con $\delta \in (0, 1]$. Questo vuol dire che ogni aperto di X è anche un aperto di (I, τ_e) dove τ_e è la topologia indotta da quella euclidea su I . Siamo quindi di fronte a due topologie confrontabili con quella di X che è più debole. Tra le varie conseguenze di questo fatto, abbiamo che ogni funzione $f : [0, 1] \rightarrow I$ (stiamo munendo $[0, 1]$ della topologia euclidea) che è continua per la topologia euclidea è continua con τ . In particolare, siccome (I, τ_e) è connesso per archi, anche X lo è. Lo stesso vale per la connessione.

Mostriamo che X è T_0 . Siano a, b due punti distinti di X . Se $a = 0$ allora ogni intorno di b diverso da X non contiene a . Se entrambi sono diversi da 0 posso assumere $a < b$: l'insieme $(0, (a+b)/2)$ è un aperto in X che contiene a ma non b . Abbiamo mostrato che per ogni coppia di punti esiste un aperto che contiene uno dei due ma non l'altro: questa è la definizione di spazio topologico T_0 .

X è compatto infatti se $\{U_j\}_{j \in J}$ è una collezione di aperti di X che copre X allora esiste almeno un $\bar{j} \in J$ tale che $0 \in U_{\bar{j}}$. Ma l'unico aperto di X che contiene 0 è X quindi ogni ricoprimento aperto contiene X . Un sottoricoprimento finito è quindi $\{U_{\bar{j}}\} = \{X\}$.

Mostrare che $P = \{3/4\}$ non è chiuso è semplice infatti il suo complementare non è aperto. Questo basta per concludere che X non è T_1 (e di conseguenza nemmeno di Hausdorff). Siccome gli aperti non banali sono tutti e soli gli insiemi del tipo $(0, \delta)$, i chiusi in X diversi da X e dal vuoto sono del tipo

$$\{0\} \cup [\delta, 1)$$

con $\delta \in (0, 1]$ e $\{0\}$. I chiusi di Y sono della stessa forma con $\delta \in (1/2, 1]$. Di conseguenza la chiusura di P in Y è $\bar{P} = \{0\} \cup [3/4, 1)$.

Il punto $Q = \{0\}$ è chiuso in X infatti il suo complementare è $(0, 1)$ che è un aperto. Di conseguenza Q è anche un chiuso in Y infatti $Q = Q \cap Y$ (tutti i chiusi di Y sono di questo tipo).

Si consideri l'arco $f : [0, 1] \rightarrow Y$ tale che $f(0) = 0$ e $f(t) = 1/2 + t/4$ (si ha quindi $f(1) = 3/4$). Mostriamo che f è un arco continuo in Y . Definiamo, per comodità, $U_\delta = (1/2, \delta)$ con $\delta \in (1/2, 1]$ e $U_0 = Y$. Questi sono tutti e soli gli aperti non vuoti di Y . Si ha

$$f^{-1}(U_\delta) = \begin{cases} \text{se } \delta = 0 & f^{-1}(Y) = [0, 1] \\ \text{se } \delta < 3/4 & (0, 4\delta - 2) \\ \text{se } \delta \geq 3/4 & (0, 1] \end{cases}$$

quindi la controimmagine di ogni aperto di Y è un aperto di $[0, 1]$ con la topologia indotta da quella euclidea: f è un arco continuo in Y che collega 0 e $3/4$.